

**PREPARAZIONE PER COLONSCOPIA
E RETTOSIGMOIDOSCOPIA
CON MOVIPREP**

⇒ (SOLO PER I PAZIENTI INTOLLERANTI
AL SELG-ESSE)

NORME DI CARATTERE GENERALE:

- 1) Nei tre giorni precedenti l'appuntamento non mangiare frutta, verdura, legumi e alimenti che contengono semi,
- 2) Acquistare in farmacia una confezione di **MOVIPREP**.
Un ciclo di trattamento comporta l'assunzione di 2 litri di Moviprep (si deve assumere tutto il prodotto altrimenti l'esame non potrà essere eseguito).
Versare il contenuto delle bustine A e B insieme in un contenitore da 1 litro ed aggiungere 1 litro d'acqua, quindi mescolare finché la polvere sarà completamente sciolta. Bere da un bicchiere di vetro il litro di soluzione nell'arco di 1-2 ore.
Ripetere la procedura con le altre due bustine A e B.
Dall'inizio del ciclo di trattamento e fino al termine dell'esame clinico non deve essere assunto alcun cibo solido.
Nel corso del trattamento assumere inoltre almeno 1 litro di liquidi chiari, come ad esempio acqua, tè e camomilla (anche zuccherati).

Non bisogna assumere purganti e non sono necessari clisteri.

MODALITA' DI ASSUNZIONE

SE L'ESAME VIENE ESEGUITO LA MATTINA:

Il giorno precedente è possibile pranzare fino alle ore 14.00.

A partire dalle ore 17.00 bere 2 litri di soluzione.

Cena e colazione del mattino seguente: solo acqua, tè, camomilla (anche zuccherati), acqua semplice.

SE L'ESAME VIENE ESEGUITO NEL POMERIGGIO (dopo le ore 13.00):

Il giorno precedente l'esame si può mangiare fino alle ore 17.00.

A partire dalle ore 19.00 bere 1 litro di soluzione.

Cena: solo acqua, tè, camomilla (anche zuccherati).

La mattina dell'esame dalle ore 8:00 bere 1 litro di soluzione.

Attenersi scrupolosamente alle suddette istruzioni.

E' possibile bere acqua, tè, camomilla fino a 2 ore prima dell'esame.

Per l'esecuzione dell'esame occorre presentarsi con le seguenti impegnative:

1. COLONSCOPIA O RETTOSIGMOIDOSCOPIA.
2. ESAME ISTOLOGICO (solo per i pazienti fuori regione)

**PORTARE LA DOCUMENTAZIONE MEDICA PRECEDENTE:
ESAMI EMATICI, RADIOGRAFIE, BIOPSIE, EVENTUALI ALTRE ENDOSCOPIE**


SE SI STANNO ASSUMENDO FARMACI CHE ALTERANO LA COAGULAZIONE (come Sintrom, Coumadin, Ticlopidina, Aspirina e Clopidogrel), CHIEDERE AL MEDICO CURANTE PER VALUTARNE LA CONTINUAZIONE O MODIFICA DELL'ASSUNZIONE PRIMA DELL'ESAME ENDOSCOPICO.

Eventuali terapie per l'Ipertensione arteriosa vanno comunque assunte con poca acqua, anche se a digiuno.

➔ RECARSI ACCOMPAGNATI, IN CASO DI SEDAZIONE NON SI POTRA' GUIDARE ALCUN MEZZO O SVOLGERE ALTRE ATTIVITA' CHE RICHIEDANO ATTENZIONE, PER LE 12 ORE SUCCESSIVE ALL'INDAGINE.

➔ Portare tessera sanitaria, codice fiscale e documento di identità.

Dott.ssa Motta Roberta
Servizio di Gastroenterologia
ed Endoscopia Digestiva
Casa di Cura Igea S.p.A.


TIMBRO E FIRMA DEL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO DI GASTROENTEROLOGIA
ED ENDOSCOPIA DIGESTIVA
(Dott.ssa R. Motta)