



SERVIZIO DI DIAGNOSTICA PER IMMAGINI

Responsabile Medico: A. Esseridou

Responsabile Tecnico: R. Moltrasi

SCHEMA DI PRETRATTAMENTO FARMACOLOGICO PER ESECUZIONE DI ESAMI CONTRASTOGRAFICI

I pazienti con pregresse reazioni allergiche gravi a mezzo di contrasto non noto o che hanno avuto reazioni anafilattiche da cause sconosciute, necessitano di un trattamento farmacologico prima dell'esecuzione dell'esame, come di seguito specificato:

13 ORE PRIMA DELL'ESAME

- PREDNISONONE per via orale 25 mg (2 cp.)
- ESOMEPRAZOLO 40 mg

7 ORE PRIMA DELL'ESAME

- PREDNISONONE per via orale 25 mg (2 cp.)
- ESOMEPRAZOLO 40 mg

1 ORA PRIMA DELL'ESAME

- PREDNISONONE per via orale 25 mg (2 cp.)
- ESOMEPRAZOLO 40 mg
- CETIRIZINA DICLORIDRATO per via orale 10 mg (1 cp. da 10mg)

Come da normativa vigente, il presente modulo indica esclusivamente il principio attivo del farmaco per lasciare la facoltà di assumere un medicinale equivalente.